

SCHEDA N° 0333

EXSICCATA N° FCRV-48

ORDINE Boletales

GENERE Xerocomellus	SPECIE pruinatus	AUTORE (Fr.) Šutara	
DATA DI RACCOLTA 17/09/2024	LUOGO DI RACC. villa Ca Marcello	COMUNE Piombino Dese	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 26	I.G.M. 105 III	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola-Flavio Franco Pinton	
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO 45.716872,12.063425			

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : BOSCO MISTO DI LATIFOLGLIA		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="text"/>

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : BOSCO MISTO DI LATIFOLGLIA SOTTO QUERCUS ROBUR

NOTE : Vari esemplari trovati nel bosco di villa Ca Marcello- sotto Quercus robur in unica stazione di crescita Levada.

MICROSCOPIA: spore bruno-olivastre in massa, piuttosto fusiformi e lievemente striate longitudinalmente, 12- 15 x 4-5 µm

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia AMB vol.1 a pag. 364, Funghi d'Italia Zanichelli a pag.496 al 1393.

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola-Flavio Franco Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



XEROCOMELLUS PRUINATUS



XEROCOMELLUS PRUINATUS1



XEROCOMELLUS PRUINATUS2



XEROCOMELLUS PRUINATUS3



XEROCOMELLUS PRUINATUS4

DESCRIZIONE

Xerocomellus pruinatus

Ordine: Boletales
Famiglia: Boletaceae
Genere: Xerocomellus
Specie: Pruinatus
Sezione: Xerocomus

Sinonimi: Boletus pruinatus Fr. & Hök 1
Xerocomus pruinatus (Fr.) Quéf.
Suillus pruinatus (Fr.) Kuntz

Cappello: fino a 10 cm di diametro, prima emisferico, poi convesso e appianato, tipicamente martellato, sinuoso, margine ondulato, cuticola asciutta, pruinosa e vellutata, brunastra, rosso-brunastra, rossastra nelle screpolature.

Tubuli: da giallo-biancastri a giallo-oliva, più corti della carne. Pori rotondi poi presto angolosi e concolori ai tuboli, al tocco virano lentamente al blu.

Carne: giallastra, bruno-vinosa solo alla base del gambo, al taglio virante lentamente al blu; odore non significativo, sapore dolce leggermente acidulo.

Gambo: cilindraceo, più o meno slanciato, prima giallo limone, poi con l'età diventa rosso barbabietola, ricoperto da una punteggiatura concolore, biancastro alla base per presenza di feltro miceliare.

Spore: bruno-olivastre in massa, piuttosto fusiformi e lievemente striate longitudinalmente, 12- 15 x 4-5 µm.

Habitat: fungo simbiote, sia sotto latifoglie che conifere, soprattutto faggio, castagno ed abete bianco. in questo caso i vari esemplari trovati nel bosco di villa Ca Marcello- sotto Quercus robur in unica stazione di crescita.

Autore della scheda: C.d.s. Gruppo Micologico Castellano APS

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola